

## ДЛЯ ЖИЗНИ, ПОЛНОЙ ОБЪЯТИЙ И УЛЫБОК

Не позволяйте сialорее встать  
у вас на пути



- Подтвержденный профиль переносимости и безопасности<sup>1,2</sup>
- Значительное снижение скорости нестимулированного слюноотделения с непрерывным улучшением после повторных инъекций<sup>2</sup>
- **Индивидуальная** схема дозирования в зависимости от массы тела<sup>1</sup>

**Ксеомин®**  
Ботулинический токсин типа А  
ДОСТИЖЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЦЕЛИ

Какая цель у Вас и Ваших пациентов? Мы стремимся вывести комплексную терапию БТА на следующий (NEXT) уровень. Вместе.

- **Networking specialists:** укрепление сотрудничества между неврологами и другими специалистами по выполнению инъекций БТА
- **Education:** обучение технике выполнения инъекций в условиях клинической практики на международном уровне
- **Xeomin:** единственный ботулинический токсин типа А, очищенный от комплексообразующих белков
- **Team:** разработка и реализация проектов сплоченной командой, в которую входят менеджеры Мерц, врачи и сотрудники клиник

Networking specialists – сеть специалистов; Education – образование; Xeomin – Ксеомин; Team – команда (пер. с англ. яз.).

#### Ксеомин®

**Регистрационное удостоверение:** № ЛСР-004746/08.

**Лекарственная форма:** лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения. Ксеомин представляет собой ботулинический токсин, продуцируемый штаммом бактерии *Clostridium botulinum* типа А, освобожденный от комплексообразующих белков.

**Состав (1 флакон):** ботулинический токсин типа А – 50 ЕД или 100 ЕД; сахароза – 4,7 мг; сывороточный альбумин человека – 1,0 мг.

**Описание:** лиофилизат белого цвета.

**Фармакотерапевтическая группа:** периферический миорелаксант.

**Показания к применению:** блефароспазм, идиопатическая цервикальная дистония (спастическая кривошея) преимущественно ротационной формы, спастичность руки после инсульта, гиперкинетические складки (мимические морщины) лица. Спастическая эквинусная и эквиноварусная деформация стопы при детском церебральном параличе у детей в возрасте от 2 до 18 лет. Хроническая сialореея у пациентов от 2 до 18 лет.

**Ксеомин эффективен и хорошо переносится при использовании интервалов между инъекциями от 6 до 20 недель (медиана: 12 недель).**

**Интервалы между инъекциями должны определяться на основе индивидуальной потребности пациента.**

**Противопоказания:** препарат противопоказан людям с аллергией к компонентам препарата, при нарушениях нервно-мышечной передачи. Препарат не вводят при повышенной температуре и острых инфекционных или неинфекционных заболеваниях. Препарат противопоказан при беременности и лактации.

**Побочное действие:** в редких случаях возможны побочные реакции в виде птоза, сухости глаз, дисфагии, мышечной слабости, головной боли, нарушения чувствительности, которые полностью обратимы и имеют временный характер.

**Условия хранения и транспортирования:** при комнатной температуре (не выше 25 °С).

**Срок годности:** 3 года.

**Условия отпуска:** по рецепту.

**Производитель:** «Мерц Фарма ГмБХ и Ко.КГаА», D-60318, Германия, Франкфурт-на-Майне.

123112, Москва, Россия, Пресненская набережная 10, блок С, ООО «Мерц Фарма». Тел. +7 (495) 653 8 555

Материал предназначен для специалистов здравоохранения.

Полная информация о препарате – в инструкции по медицинскому применению.

1. Инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата Ксеомин®

2. Berweck S et al. SIPLEX: Placebo-controlled clinical trial of incobotulinumtoxinA for sialorrhea in children. Neurology. 2021 Aug 2;10.1212/WNL.0000000000012573.