

# Цитохром С

**ОРИГИНАЛЬНЫЙ АНТИГИПОКСАНТ  
С ДВОЙНЫМ МЕХАНИЗМОМ  
ДЕЙСТВИЯ**



## Показания к применению:

Цитохром С применяют в комплексной терапии в качестве средства, улучшающего тканевое дыхание, при состояниях, сопровождающихся нарушением окислительно-восстановительных процессов в организме

## Определение индивидуальной чувствительности:



Растворить в 4 мл воды для инъекций



Подкожно вводят 0,1 мл раствора препарата (0,25 мг действующего вещества)



Если в течение 30 минут не наступает кожная реакция, то можно приступать к лечению препаратом

## Способ применения и дозы

10–20 мг действующего вещества, непосредственно перед инъекцией, растворяют в 4–8 мл воды для инъекций и вводят внутривенно медленно или внутримышечно 1–2 раза в день. Курс лечения составляет 10–14 дней\*.

По 10 мг в/м 1 раз в день  
**10 дней**

Перерыв  
**10 дней**

По 10 мг 1 раз в день  
**10 дней**

# Цитохром С

- эффективный комбинаторный агент  
при различных формах гипоксии



## ПРИ СЕРДЕЧНОЙ НЕДОСТАТОЧНОСТИ

- При сердечной недостаточности препарат разводят в 200 мл 0,9 % раствора натрия хлорида или 5 % раствора декстрозы и вводят внутривенно капельно (30–40 капель в минуту) в течение 6–8 часов.
- Суточная доза составляет 30–80 мг действующего вещества.



## В СЛУЧАЕ ТЯЖЕЛОГО СОСТОЯНИЯ

- В случае тяжелого состояния (травма, шок, печеночная кома, отравление снотворными препаратами и окисью углерода) препарат назначают внутривенно по 50–100 мг действующего вещества, растворив его непосредственно перед инъекцией в 20–40 мл воды для инъекций.



## ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ

- При бронхиальной астме препарат назначают внутримышечно по 5–10 мг действующего вещества, растворив его непосредственно перед инъекцией в 2–4 мл воды для инъекций, 2 раза в день. Курс лечения составляет 14–25 дней и зависит от тяжести гипоксии.



## В ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОМ ПЕРИОДЕ

- В послеоперационном периоде (операции по поводу врожденных и приобретенных пороков сердца) препарат вводят внутривенно по 10 мг действующего вещества, растворив его непосредственно перед инъекцией в 4 мл воды для инъекций, 2 раза в день.



## ПРИ АСФИКСИИ НОВОРОЖДЕННЫХ

- При асфиксии новорожденных препарат вводят в пупочную вену на протяжении первых двух минут после рождения в дозе 10 мг действующего вещества, растворив его в 4 мл воды для инъекций.

