

Посетите наш веб-сайт
www.heel-russia.ru

ООО «Хеель Рус»
115035, Москва,
Космодамианская наб., д. 52, стр. 3
+7 (495) 937-78-25;
info@heel-russia.ru;
PV@heel-russia.ru

ООО «Хеель Рус» является
организацией, принимающей
претензии потребителей по
продукции производителя Биологише
Хайльмиттель Хеель ГмбХ, Германия.

RU-MIOHCP.All.02.06032020

-Heel
Healthcare designed by nature

Меню алгоритмов лечения с применением
биорегуляционных препаратов Heel



Меню алгоритмов лечения с применением биорегуляционных препаратов



Неврология

- Боль в спине (спондилоартроз, миозит) 4
- Полинейропатия 6
- Осложнения цереброваскулярных заболеваний/ реабилитация 8
- Головокружение 10



Травматология/хирургия

- Артрит 12
- Травмы мягких тканей 14
- Варикозное расширение вен (геморрой) 16
- Атеросклероз 18



Гастроэнтерология

- Гастрит, Дуоденит 20
- СРК (синдром раздраженного кишечника) 22
- Функциональная диспепсия 24



Урология

- Воспалительные заболевания урогенитальной системы у мужчин 26



Гинекология

- Воспалительные заболевания урогенитальной системы у женщин 28
- Менструальная дисфункция. Дисменорея 30
- Климакс 32



Оториноларингология

- Синусит острый 34
- Синусит хронический 36
- Фарингит 38
- Отит 40
- Тонзиллит 42



Педиатрия

- ОРИ. Базисная регуляционная терапия 44
- ОРИ. Симптоматическое лечение 46

Алгоритмы терапии в неврологии

Боль в спине
(спондилоартроз, миозит)



Траумель® С

Раствор для внутримышечного и околосуставного введения

Вводить внутримышечно
по 1 ампуле 3 раза в неделю
в течение 2 недель

продолжение
терапии

Траумель® С

Таблетки для рассасывания

Применять по 1 таблетке
3 раза в день
не менее 4 недель



www.heel-russia.ru

- Моцар С. И., Игнатьев Е. О. Опыт применения антигомотоксических препаратов Траумель С, Цель Т, Дискус композитум в лечении деформирующего артроза, спондилоартроза и остеохондроза позвоночника. Бюл. Тер. 2000;(2):34-42.
- Агасаров Л.Г., Гальперин С.Н., Петров А.В., Чузавкова Е.А., Шестаков П.А. Дискус композитум в комплексной терапии поясничных нейропатологических синдромов. Биологическая Медицина. 1997;(2):25-27.

4

Спаскупрель®

Таблетки для рассасывания

Применять по 1 таблетке
3 раза в день
не менее 6 недель



при
спазмах

при
симптомах
радикулопатии

в случае
нарушений сна
добавить

Дискус композитум

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно
по 1 ампуле 3 раза в неделю
в течение 2 недель



Нервохель®

Таблетки для рассасывания

Применять по 1 таблетке
3 раза в день за 30 мин до еды
или спустя 1 час после приема пищи
Курс лечения составляет 2-3 недели



3. Шавга Н.Г., Шавга Н.Н. Антигомотоксическая терапия при болях в пояснице у детей и подростков. Биологическая Терапия. 2009(4):30-33.

4. Weiser M, Reus V. Behandlung von Krampfzuständen mit Spascupreel: Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung. Biol Med. 2000;29(1):14-17.

5. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель® С, РУ: П N011686/04 от 16.07.2010, П N011686/01 от 09.06.2010; Инструкция по медицинскому применению препарата Спаскупрель®, РУ: № П N013497/01 от 13.02.2008; Инструкция по медицинскому применению препарата Дискус композитум, РУ: П N014019/01 от 02.04.2008; Инструкция по медицинскому применению препарата Нервохель®, РУ: П N012837/01 от 24.12.2008.

5

Алгоритмы терапии в неврологии

Полинейропатия



www.heel-russia.ru

6

1. Dietz A-R. Possibilities for a lymph therapy with diabetic polyneuropathy: Matrix therapy with type II diabetes; a practice-based study [in German]. *Biol Med.* 2000;29(1):4-9.
2. Eiber A, Klein P, Weiser M. Diabetic peripheral neuropathy: adjuvant homeopathic treatment enhances the effects of conventional therapy [in German]. *Allgemeinarzt.* 2003;(8):1-8.
3. Zenner S, Metelmann H. Therapeutic use of Lymphomyosot: results of a multicentre use observation study on 3,512 patients. *Biol Ther.* 1990;8(4):79-84.

Коэнзим композитум

Раствор
для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле
1-3 раза в неделю на протяжении
2-8 недель



При острой боли

Траумель®С

Раствор для внутримышечного
и околосуставного введения

Применять НПВС в течение 2-3 дней,
затем перейти на инъекции Траумель®С
(внутримышечно по 1-2 ампуле
3 раза в неделю)



Курс лечения составляет 4-5 недель

4. Küstermann K, Weiser M. Treatment of lymphatic diseases with a homeopathic medicinal product [in German]. *Biol Med.* 1997;26(3):110-114.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Коэнзим композитум, РУ: П N014024/01 от 17.03.2008.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/04 от 16.07.2010.

7

Алгоритмы терапии в неврологии

Осложнения
цереброваскулярных
заболеваний/
реабилитация



www.heel-russia.ru

Церебрум композитум® Н

Раствор для инъекций

Вводить внутримышечно,
внутрикожно, подкожно
по 1 ампуле 1-3 раза в неделю

Курс лечения
составляет 4-6 недель



альтернативная
комбинация

Плацента композитум

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно
по 1 ампуле через день

Средний курс лечения составляет 3 недели



Коэнзим композитум

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле
1-3 раза в неделю на протяжении 2-8 недель



Нервохель®

Таблетки для рассасывания

Рассасывать под языком по 1 таблетке
3 раза в день за 30 минут до еды
или спустя 1 час после приема пищи

Курс лечения составляет 2-3 недели



1. Дробышев В.А., Шпагина Л.А., Гудкова Е.В. и др. Применение фармакопунктуры в комплексной реабилитации больных в раннем восстановительном периоде мозгового инсульта. *Consilium Medicum*. 2017; 19 (2.3. Неврология и Ревматология): 19–22.

2. Кобысь Т.А. Эффективность применения препаратов Cerebrum Compositum и Coenzyme Compositum в комплексном лечении больных ишемическим инсультом. *Биологическая терапия*. 2000;(3):20-24.

3. Соколова Л.И., Мельник В.С., Ласкаржевская Н.М., Тымриенко А.В., Скрипка Н.В. Антигомотоксическая коррекция хронической мозговой сосудистой недостаточности [и в Russian]. *Биологическая терапия*. 2008;(4):20-22.

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Церебрум композитум® Н, РУ: П N012126/01 от 13.01.2011.


5. Инструкция по медицинскому применению препарата Плацента композитум, РУ: П N012488/01 от 21.10.2010.

6. Инструкция по медицинскому применению препарата Коэнзим композитум, РУ: П N014024/01 от 17.03.2008.

7. Инструкция по медицинскому применению препарата Нервохель®, РУ: П N012837/01 от 24.12.2008.

Алгоритмы терапии в неврологии

Головокружение



www.heel-russia.ru

1. Issing W, Klein P, Weiser M. The homeopathic preparation Vertigoheel versus Ginkgo biloba in the treatment of vertigo in an elderly population: a double-blinded, randomized, controlled clinical trial. *J Altern Complement Med.* 2005;11(1):155-160.
2. Wolschner U, Strösser W, Weiser M, Klein P. Treating vertigo – homeopathic combination remedy therapeutically equivalent to dimenhydrinate: results of a reference-controlled cohort study [in German]. *Biol Med.* 2001;30(4):184-190.

10

Вертигохель®

Капли для приема внутрь

Принимать по 10 капель,
растворив в 100 мл воды, 3 раза в день

При острых внезапных приступах
головокружений и тошноты принимать
сначала по 10 капель каждые 15 минут
(не более 2 часов)

Курс терапии 2-3 недели



3. Seeger-Schellerhoff E, Corgiolo M. Effectiveness and tolerability of the homeopathic treatment Vertigoheel for the treatment of vertigo in hypertensive subjects in general clinical practice. *Eur J Integr Med.* 2009;1(4):231.
4. Weiser M, Stroesser W, Klein P. Homeopathic vs conventional treatment of vertigo: a randomized double-blind controlled clinical study. *Arch Otolaryngol Head Neck Surg.* 1998;124(8):879-885.
5. Weiser M, Strösser W. Vergleichsstudie Homöopathikum vs. Betahistin: Behandlung des Schwindels. *Allgemeinarzt.* 2000;22(13):962-964.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Вертигохель®, РУ: П N012400/01.

11

Артрит

Алгоритмы терапии в травматологии/хирургии

Цель®Т

Раствор для внутримышечного введения/Таблетки для рассасывания

Вводить внутримышечно
2 ампулы в неделю
на протяжении 2 недель

Продолжать терапию приемом таблеток Цель®Т (по 1 таблетке 3 раза в день) в течение 3 месяцев

Повторный курс возможен через 3 месяца



www.heel-russia.ru

1. Lozada CJ, del Rio E, Reitberg DP, Smith RA, Kahn CB, Moskowitz RW. A double-blind, randomized, saline-controlled study of the efficacy and safety of co-administered intra-articular injections of Tr14 and Ze14 for treatment of painful osteoarthritis of the knee: The MOZART trial. Eur J Integr Med. 2017;13:54-63.
2. Lesiak A, Gottwald R, Weiser M. Effectiveness of the treatment of degenerative joint disease with periarticular, intraarticular, and intramuscular injections of Zeel T [in Polish]. Medyc Biol. 2001(2): 30-36.
3. Gottwald R, Weiser M. Treatment of Osteoarthritis of the Knee with Zeel T. Medicina Biol. 2000;13(4):109-113.
4. Модары С.И., Игнатьев Е.О. Опыт применения антигомотоксических препаратов Traumeel S, Zeel T, Discus compositum в терапии деформирующих артрозов, спондилоартрозов и остеохондроза позвоночника. Биологическая терапия. 2000;2:34-42.
5. Марушко Т.В. Опыт применения антигомотоксических препаратов в комплексном лечении реактивного артрита у детей [in Russian]. Биологическая терапия. 2012(1):20-24.
6. Maiko OJ. Therapy of osteoarthritis of the knee with a combined Zeel T/NSAID treatment [in German]. Biol Med. 2002;31(2):68-74.
7. Wodick RE, Steininger K, Zenner S. The biological treatment of articular affections: results of a study conducted with 498 patients. Biol Ther. 1995;13(3):72-80.

в случае обострения

Траумель®С

Раствор для внутримышечного и околосуставного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле ежедневно или 2 раза в неделю в течение 2 недель



Цель®Т

Мазь для наружного применения

Наносить 4-5 см мази на кожу в области болезненных суставов и втирать легкими движениями 2-3 раза в день

Возможно наложение марлевой повязки

Курс лечения при артозах – 5-10 недель, при спондилоартрозе и плечелопаточном периартрите – около 4 недель



при наличии спондилоартроза

ДИСКУС КОМПОЗИТУМ

Раствор для внутримышечного введения

Вместо Цель®Т

Вводить внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю на протяжении 2-8 недель



Травмы мягких тканей

www.heel-russia.ru

Алгоритмы терапии в травматологии/хирургии



1. Zenner S, Metelmann H. Application possibilities of Traumeel S injection solution: results of a multicentric drug monitoring trial conducted on 3,241 patients. *Biol Ther.* 1992;10(4):301-310.
2. Zenner S, Metelmann H. Therapy experience with a homeopathic ointment: results of drug surveillance conducted on 3,422 patients. *Biol Ther.* 1994;12(3):204-211.
3. Böhmer D, Ambros P. Treatment of sports injuries with Traumeel ointment: a controlled double-blind study. *Biol Ther.* 1992;10(4):290-300.
4. Thiel W, Borho B. Posttraumatische Kniegelenksgüsse und intraartikuläre Traumeel-N-Injektion. *Orthopädische Prax.* 1991;27(11):721-725.
5. Zell J, Connert WD, Mau J, Feuerstake G. Treatment of acute sprains of the ankle: a controlled double-blind trial to test the effectiveness of a homeopathic ointment. *Biol Ther.* 1989;7(1):1-6.
6. Weiser M, Zenner S. Orale Therapie traumatischer, entzündlicher und degenerativer Affektionen mit einem Homöopathikum. *Biol Med.* 1996;25(5):211-216.
7. Birnesser H, Oberbaum M, Klein P, Weiser M. The homeopathic preparation Traumeel S compared with NSAIDs for symptomatic treatment of epicondylitis. *J Musculoskelet Res.* 2004;08(2 & 3):119-128. doi:10.1142/S0218957704001284

Траумель®С

Раствор для внутримышечного и околосуставного введения или Таблетки для рассасывания

Вводить внутримышечно по 1 ампуле
3 раза в неделю или применять
по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-3 недель



в сочетании

Траумель®С

Мазь для наружного применения

Достаточное количество мази наносить
тонким слоем на кожу болезненных
областей тела и втирать легкими
движениями 2-3 раза в день

Возможно наложение марлевой повязки



8. Schneider C, Klein P, Stolt P, Oberbaum M. A homeopathic ointment preparation compared with 1% diclofenac gel for acute symptomatic treatment of tendinopathy. *Explor J Sci Heal.* 2005;1(6):446-452. doi:10.1016/j.explore.2005.08.010
9. Schneider C, Schneider B, Hanisch J, van Haselen R. The role of a homeopathic preparation compared with conventional therapy in the treatment of injuries: an observational cohort study. *Complement Ther Med.* 2008;16(1):22-27. doi:10.1016/j.ctim.2007.04.004
10. González de Vega C, Speed C, Wolfarth B, González J. Traumeel vs. diclofenac for reducing pain and improving ankle mobility after acute ankle sprain: a multicentre, randomised, blinded, controlled and non-inferiority trial. *Int J Clin Pract.* 2013;67(10):979-989. doi:10.1111/ijcp.12219
11. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/04 от 16.07.2010, П N011686/01 от 09.06.2010, П N011686/02 от 26.05.2009.

Алгоритмы терапии в травматологии/хирургии

Варикозное расширение вен (геморрой)



www.heel-russia.ru

16

1. Heine H, Weiser M. Aesculus compositum – a drug monitoring study [in German]. Naturamed. 1998;13(6):19-22.

Эскулюс композитум

Капли для приема внутрь

Принимать внутрь по 10 капель,
предварительно разведенных в 30 мл воды,
3 раза в день за 30 минут до еды
или через 1 час после еды

При обострении заболевания
принимать по 10 капель каждые
15 минут (в течение 2 часов)

Курс лечения до 5 недель



2. Инструкция по медицинскому применению препарата Эскулюс композитум, РУ: П N013342/01 от 30.06.2008.

17

Алгоритмы терапии в травматологии/хирургии

Атеросклероз

Плацента композитум

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно
по 1 ампуле через день

Средний курс лечения
составляет 3 недели



Гепар композитум®

Раствор для внутримышечного
и подкожного введения

Вводить 1-3 раза в неделю
по 1 ампуле внутримышечно, подкожно

Курс терапии при острых заболеваниях
3-5 недель; при хронических
заболеваниях не менее 4-8 недель



Эскулюс композитум

Капли для приема внутрь

Принимать внутрь по 10 капель,
предварительно разведенных
в 30 мл воды, 3 раза в день
за 30 минут до еды или через
1 час после еды

При обострении заболевания
принимать по 10 капель
каждые 15 минут (в течение 2 часов)


Курс лечения до 5 недель



- Михалев К.А. Возможности комплексных биологических препаратов в оптимизации лечения сердечной недостаточности у больных ишемической болезнью сердца // Биологическая терапия. 2008. № 8. — С. 14-18.
- Шамуния Б.К, Сидорова Н.Н, Алексеенко Е.И. Коррекция нарушений эндотелиальной функции у больных гипертонической болезнью с помощью антигомостатических препаратов // Биологическая терапия. 2002 - №8. — С.13-15
- Соколова Л.И, Мельник В.С, Ласкаржевская Н.М, Тыриленко А.В. Антигомотоксическая коррекция хронической мозговой сосудистой недостаточности // Биологическая терапия. 2008. № 4. — С. 20-22.
- Heine H, Weiser M. Aesculus compositum – a drug monitoring study [in German]. Naturamed. 1998;13(6):19-22.
- Инструкция по медицинскому применению препарата Плацента композитум, РУ: П N012488/01 от 21.10.2010.
- Инструкция по медицинскому применению препарата Гепар композитум®, РУ: П N012917/01.
- Инструкция по медицинскому применению препарата Эскулюс композитум, РУ: П N013342/01 от 30.06.2008.

Алгоритмы терапии в гастроэнтерологии

Гастрит, Дуоденит



www.heel-russia.ru

1. Мухина Ю. Г., Ильинко Л. И., Рура Е. А. Потенциал препаратов природного происхождения в лечении язвенной болезни у детей. Детские инфекции. 2007;6(2):55-60.
2. Хмелевская А.В. Гастикумель в терапии хронического гастрита. Биологическая терапия. 1998;(1):39.
3. Ricken KH. Clinical treatment of functional dyspepsia and Helicobacter pylori gastritis. Biomed Ther. 1997;15(3):76-81.
4. Borner M, Weiser M, Küstermann K. Treatment of various diseases of the mucosa with Mucosa compositum – results of an observational study [in German]. Biol Med. 1994;23(4):205-209.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Гастикумель, РУ: П N013496/01 от 17.03.2008.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Мукоза композитум®, РУ: П N012916/01 от 22.12.2010.

Гастикумель

Таблетки для рассасывания

Применять по 1 таблетке 3 раза в день за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи

При обострениях принимать по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов (но не более 12 таблеток в день)

Курс лечения составляет 2-3 недели

в сочетании



Мукоза композитум®

Раствор для внутримышечного и подкожного введения


При острых стадиях заболевания вводить ежедневно по 1 ампуле, в течение первых 3 дней, затем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле; при хронических заболеваниях 1-3 раза в неделю вводить по 1 ампуле внутримышечно, подкожно

Курс терапии при острых стадиях заболевания 2-5 недель, при хронических заболеваниях (особенно гастриты) не менее 6 недель



Алгоритмы терапии в гастроэнтерологии

СРК



www.heel-russia.ru

1. Миху И.И., Плешка В.А., Морару Е.Т. и др. Опыт применения антигомотоксических препаратов при лечении синдрома раздраженного кишечника у детей. Биол Тер. 2006;(4):14-18.

2. Weiser M, Reus V. Behandlung von Krampfzuständen mit Spascupreel: Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung. Biol Med. 2000;29(1):14-17.

при
спазмах

Спаскупрель®

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день,
рассасывать под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема пищи

При обострениях принимают по 1 таблетке
каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов

Курс терапии составляет не менее 2-3 недель
и может быть увеличен



в сочетании

Нервохель®

Таблетки для рассасывания

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день
за 30 минут до еды или спустя 1 час после приема пищи

Курс лечения составляет 2-3 недели



Алгоритмы терапии в гастроэнтерологии

Функциональная диспепсия

Гастрикумель

Таблетки для рассасывания

Применять по 1 таблетке
3 раза в день за полчаса
до еды или спустя 1 час
после приема пищи

При обострениях принимать
по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более
двух часов (но не более
12 таблеток в день)

Курс лечения составляет 2-3 недели



Нервохель®

Таблетки для рассасывания

Рассасывать под языком по 1 таблетке
3 раза в день за 30 минут до еды
или спустя 1 час после приема пищи


Курс лечения составляет 2-3 недели



1. Ricken KH. Clinical treatment of functional dyspepsia and Helicobacter pylori gastritis. *Biomed Ther.* 1997;15(3):76-81.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Гастрикумель, РУ: П N013496/01 от 17.03.2008.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Нервохель®, РУ: П N012837/01 от 24.12.2008.

Алгоритмы терапии в урологии

Воспалительные заболевания мочеполовой системы у мужчин



www.heel-russia.ru

Берберис-Гомаккорд

Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 10 капель
(растворенных в 30 мл воды)
3 раза в день за 30 минут
до или через 1 час после еды

При острых симптомах
принимать через каждые
15 минут по 10 капель
в течение 2 часов

Принимать
до отсутствия симптомов



1. Радионов В.Г., Шатилов А.В., Семиряд Ю.В., Радионов Д.В. Антигомотоксические препараты в лечении резидуальных уретритов. Биол. терапия.-2002.-№1.-С16-18.
2. Инструкция по медицинскому применению препарата Берберис-Гомаккорд, РУ: П N014700/01.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Ренель®, РУ: П N013501/01 от 24.03.2009.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Солидаго композитум С, РУ: П N012225/01 от 01.04.2011.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Мукоза композитум®, РУ: П N012916/01 от 22.12.2010.

При хроническом уролитиазе

Ренель®

Таблетки для рассасывания

Рассасывать под языком
по 1 таблетке 3 раза в день
за 30 минут до еды или спустя
1 час после приема пищи

В острых случаях принимать
по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более двух часов



При обострении хронического воспаления

Солидаго композитум С

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно
по 1 ампуле 1-3 раза в неделю
на протяжении 3 недель



при остром состоянии

Мукоза композитум®

Раствор для внутримышечного и подкожного введения

Вводить ежедневно по 1 ампуле, в течение первых 3 дней, затем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле; при хронических заболеваниях 1-3 раза в неделю вводить по 1 ампуле внутримышечно, подкожно

Курс терапии при острых стадиях заболевания
2-5 недель, при хронических заболеваниях не менее 6 недель



Алгоритмы терапии в гинекологии

Воспалительные заболевания урогенитальной системы у женщин



Гинекохель®

Капли для приема внутрь

Принимать внутрь по 10 капель,
растворив в 30 мл воды,
3 раза в день внутрь

При обострениях по 10 капель
каждые 15 мин (в течение 2 часов)

Курс терапии составляет 2-3 недели



www.heel-russia.ru

1. Borner M, Weiser M, Küstermann K. Treatment of various diseases of the mucosa with Mucosa compositum – results of an observational study [in German]. Biol Med. 1994;23(4):205-209.

2. Weiser M, Reus V. Behandlung von Krampfzuständen mit Spascupreel: Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung. Biol Med. 2000;29(1):14-17.

3. Подольский В.В., Дронова В.В., Гульчий Л.П., Лысянская Т.А., Латышева З.М. Возможности антигомотоксического лечения при инфекционно-воспалительных процессах женских половых органов на ранних сроках беременности. Биол Тер. 2003;(4):16-20.

4. Бакшев ЗП, Неймарк СЛ. Тактические подходы к выявлению и лечению Trichomonada urogenitalis у больных хроническим сальпингоофоритом. Биол Тер (Украина). 2002(4):34-41.

5. Инструкция по медицинскому применению препарата Гинекохель®, РУ: П N012356/01 от 01.04.2011.

6. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/01 от 09.06.2010, П N011686/03 от 29.05.2009.

7. Инструкция по медицинскому применению препарата Мукоза композитум®, РУ: П N012916/01 от 22.12.2010.

8. Инструкция по медицинскому применению препарата Спаскупрель®, РУ: П N013497/01 от 13.02.2008.

при тяжелом
течении

Траумель®С

Таблетки для рассасывания
или Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в день
в течение 2-3 недель или по 10 капель 3 раза в день,
при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день

Капли принимать внутрь за 15 минут до еды,
развести в 1 чайной ложке воды и перед
проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет не менее 3-4 недель



симптоматически
при спазмах

Мукоза композитум®

Раствор для внутримышечного
и подкожного введения

Вводить ежедневно по 1 ампуле в течение первых
3 дней, затем 1-3 раза в неделю по 1 ампуле;
при хронических заболеваниях 1-3 раза в неделю
вводить по 1 ампуле внутримышечно, подкожно

Курс терапии при острых стадиях заболевания
2-5 недель, при хронических заболеваниях не менее 6 недель



Спаскупрель®

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день,
рассасывать под языком за полчаса
до еды или спустя 1 час после приема пищи

При обострениях принимают по 1 таблетке
каждые 15 минут на протяжении не более 2 часов

Курс терапии составляет не менее
2-3 недель и может быть увеличен



Алгоритмы терапии в гинекологии

Менструальная дисфункция. Дисменорея



www.heel-russia.ru

1. Weiser M, Reus V. Behandlung von Krampfzuständen mit Spascupreel: Ergebnisse einer Anwendungsbeobachtung. *Biol Med.* 2000;29(1):14-17.
2. Weiser M, Reus V. Treatment of gynaecological diseases with a modern homeopathic [in German]. *Biol Med.* 2001;30(6):288-291.

30

3. Reus V, Weiser M. Homeopathic treatment of gynecological disorders [in German]. *Biol Med.* 1999;28(5):233-236.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Спаскупрель®, РУ: П N013497/01 от 13.02.2008.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Гормель СН, РУ: П N014136/01 от 06.11.2009.

31

Спаскупрель®

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке
3 раза в день, рассасывать
под языком за полчаса
до еды или спустя 1 час
после приема пищи

При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более двух часов

Курс терапии составляет не менее
2-3 недель и может быть увеличен



Гормель СН

Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 10 капель
(растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день
за 30 минут до еды или через 1 час после еды


Средний курс лечения составляет
1-3 месяца и может быть увеличен



31

Алгоритмы терапии в гинекологии

Климакс



www.heel-russia.ru

1. Татарчук ТФ, Козей НВ. Антигомотоксические препараты в лечении ранних климактерических расстройств. Biol Ther (Ukraine). 2001;(2):33-37.
2. Penny B. Therapeutic effects of Klimakt-Heel compared with a phytotherapeutic preparation for the treatment of menopausal symptoms: a randomized study. J Biomed Ther. 2005;(Fall):7-10.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Климакт-Хель, РУ: П N012838/01 от 01.12.2010.

Климакт-Хель

Таблетки для рассасывания

Применять внутрь по 1 таблетке
3 раза в день за 30 мин до еды
или спустя 1 час после приема пищи.
Таблетку следует держать во рту
до полного рассасывания

Курс лечения составляет
1-2 месяца и может быть увеличен



Алгоритмы терапии ЛОР заболеваний

Синусит острый



www.heel-russia.ru

1. Смиян О. И., Мощич О. П., Бында т. п., Дычко М. М. Эффективность Траумеля С в комплексном лечении острого гайморита у детей. Здоровый ребенок . 2016;72(4):57-62.
2. Zennner S, Metelmann H. Empirical data on therapy with a homeopathic nasal spray. Biomed Ther. 1997;15(3):82-88.
3. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/01 от 09. 06.2010, П N011686/03 от 29.05.2009.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Эхинацея композитум СН, РУ: П N014153/01 от 16.01.2009.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Эуфорбиум композитум® Назентропфен С, РУ: П N011684/01 от 04.06.2009.

Траумель®С

Таблетки для рассасывания/Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в день
в течение 2-3 недель или по 10 капель 3 раза в день,
при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день

Капли принимать внутрь за 15 минут до еды,
развести в 1 чайной ложке воды и перед
проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет не менее 3-4 недель



Эхинацея композитум СН

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю
на протяжении 2-8 недель, курс терапии может быть увеличен



Эуфорбиум композитум® Назентропфен С

Назальный спрей

Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым -
впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день

Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день



Алгоритмы терапии ЛОР заболеваний

Синусит хронический



Траумель® С

Таблетки для рассасывания/
Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза
в день в течение 2-3 недель
или по 10 капель 3 раза в день,
при отеках мягких тканей -
по 30 капель 3 раза в день

Капли принимать внутрь за 15 минут
до еды, развести в 1 чайной ложке
воды и перед проглатыванием
поддержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет
не менее 3-4 недель



www.heel-russia.ru

1. Zenner S, Metelmann H. Empirical data on therapy with a homeopathic nasal spray. *Biomed Ther.* 1997;15(3):82-88.
2. Arighi A. Evaluation of the clinical efficacy of a homotoxicological protocol in the prevention of recurrent respiratory infections in children [in Italian]. *La Med Biol.* 2000;18(3):13-21.
3. Gottwald R, Weiser M. Treatment with an immune stimulating homeopathic preparation: results of a drug-monitoring study. *Biomed Ther.* 2000;18(2):205-210.
4. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель® С, РУ: П N011686/01 от 09.06.2010, П N011686/03 от 29.05.2009.
5. Инструкция по медицинскому применению препарата Эхинацея композитум СН, РУ: П N014153/01 от 16.01.2009.
6. Инструкция по медицинскому применению препарата Галиум-Хель, РУ: П N013311/01 от 09.02.2009.
7. Инструкция по медицинскому применению препарата Эуфорбиум композитум® Назентропfen С, РУ: П N011684/01 от 04.06.2009.
8. Инструкция по медицинскому применению препарата Энгистол®, РУ: П N013495/01 от 14.03.2008.

При
обострении

Эуфорбиум композитум® Назентропfen С

Назальный спрей

Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым -
впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день

Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день



Эхинацея композитум СН

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю
на протяжении 2-8 недель, курс терапии может быть увеличен



Галиум-Хель®

Капли для приема внутрь

Принимать внутрь по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза
в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды на протяжении 3-4 недель

Возможно проведение повторного курса лечения



Энгистол®

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день, рассасывать под языком за полчаса
до еды или спустя 1 час после приема пищи на протяжении 2-3 недель


При обострениях принимают по 1 таблетке каждые
15 минут на протяжении не более двух часов

При необходимости курс лечения можно повторить



Алгоритмы терапии ЛОР заболеваний

Фарингит



Лимфомиозот®

Капли для приема внутрь

Применять внутрь
по 15-20 капель, растворив
в 100 мл воды, 3 раза в день

Курс терапии составляет 8-12 дней



www.heel-russia.ru

1. Крамарев С.А., Палатная Л.А., Головач Е.В., Чемеркина Н.В. Применение антигомотоксических препаратов в лечении острых респираторных вирусных инфекций у детей. Биол Тер (Украина). 2005;(1):19-22.

2. Инструкция по медицинскому применению препарата Лимфомиозот®, РУ: П N012359/01 от 24.06.2010.

3. Инструкция по медицинскому применению препарата Ангин-Хель СД, РУ: П N013859/01 от 27.03.2008.

4. Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/01 от 09.06.2010, П N011686/03 от 29.05.2009.

Ангин-Хель СД

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день)

Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель

Возможно проведение повторного курса лечения



Траумель®С

Таблетки для рассасывания/
Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-3 недель или по 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день



Капли принимать внутрь за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет не менее 3-4 недель

Алгоритмы терапии ЛОР заболеваний

Отит

При наличии ринита

www.heel-russia.ru

Эуфорбиум композитум® Назентропфен С

Назальный спрей

Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым - впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день

Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день



Траумель® С

Таблетки для рассасывания/Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-3 недель или по 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день

Капли принимать внутрь за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет не менее 3-4 недель



Симптоматически

Вибуркол®

Суппозитории ректальные

Применять Ректально

При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела свыше 37,5 °C по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела свыше 38 °C по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки.
При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня



Нервохель®

Таблетки для рассасывания

Рассасывать под языком по 1 таблетке 3 раза в день за 30 минут до еды или спустя 1 час после приема пищи

Курс лечения составляет 2-3 недели



Валерианахель®

Капли для приема внутрь


Принимать внутрь по 10 капель, предварительно разведенных в 100 мл воды, 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды на протяжении 3-4 недель.

Возможное повторное проведение курса лечения



Алгоритмы терапии ЛОР заболеваний

Тонзиллит



Эхинацея композитум СН

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю на протяжении 2-8 недель, курс терапии может быть увеличен



Тонзилла композитум

Раствор для внутримышечного введения

Вводить по 1 ампуле внутримышечно 1 раз в неделю в течение 5 недель



www.heel-russia.ru

1. Крамарев С.А., Палатная Л.А., Шаповал В.Н. Опыт применения антигомотоксических препаратов Angin-Heel и Engystol в лечении детей с острым тонзиллитом. Биологическая Терапия (Украина). 2003;(3):56-60.

2. Küstermann K, Weiser M. Treatment of lymphatic diseases with a homeopathic medicinal product [in German]. Biol Med. 1997;26(3):110-114.

3. Фурсов С.Е., Данилова Н.И., Малыгина Р.И., Синева Е.Л., Ролик И.С. К вопросу о терапевтической эффективности препаратов Эхинацея композитум форте С и Тонзилла композитум у больных с неспецифическими иммунодефицитными состояниями. Биологическая Медицина [Россия]. 1996;(2):34-38.

Лимфомиозот®

Раствор для внутримышечного введения

Вводить внутримышечно по 1 ампуле 1-3 раза в неделю в течение 4 недель



СИМПТОМАТИЧЕСКИ

Траумель®С

Таблетки для рассасывания/Капли для приема внутрь

Применять внутрь по 1 таблетке 3 раза в день в течение 2-3 недель или по 10 капель 3 раза в день, при отеках мягких тканей - по 30 капель 3 раза в день

Капли принимать внутрь за 15 минут до еды, развести в 1 чайной ложке воды и перед проглатыванием подержать во рту 1-2 минуты

Курс лечения составляет не менее 3-4 недель



Ангин-Хель СД

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи. Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день)

Длительность применения препарата, в зависимости от выраженности симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель

Возможно проведение повторного курса лечения



Эуфорбиум композитум® Назентропfen С

Назальный спрей

Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым - впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день

Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день



4. Сутулова С.Г., Ильенко Л.И., Геращенко Т.И. Антигомотоксическая терапия в профилактике заболеваний лимфоглоточного кольца у детей . Российский журнал Детские инфекции. 2005;(3):67-70.

5. Резолюция Совета экспертов Национальной медицинской ассоциации оториноларингологов по проблемам патологии лимфоглоточного кольца. Российская оториноларингология, 2020;19;(104).

6. Инструкция по медицинскому применению препарата Лимфомиозот®. РУ: П N012359/02 от 09.06.2010; Инструкция по медицинскому применению препарата Эхинацея композитум СН, РУ: П N014153/01 от 16.01.2009; Инструкция по медицинскому применению препарата Тонзилла композитум, РУ: П N015835/01 от 29.05.2009; Инструкция по медицинскому применению препарата Траумель®С, РУ: П N011686/01 от 09.06.2010, П N011686/03 от 29.05.2009; Инструкция по медицинскому применению препарата Ангин-Хель СД, РУ: П N013859/01 от 27.03.2008; Инструкция по медицинскому применению препарата Эуфорбиум композитум® Назентропfen С, РУ: П N011684/01 от 04.06.2009.

Алгоритмы терапии в педиатрии

ОРИ. Базисная регуляционная терапия



www.heel-russia.ru

44

1. Крамарев С.А., Палатная Л.А., Шаповал В.Н. Опыт применения антигомотоксичных препаратов Angin-Heel и Engystol в лечении детей с острым тонзиллитом. Биологическая Терапия. 2003;(3):56-60.
2. Крамарев С.А., Палатная Л.А., Шаповал В.Н., Чемеркина Н.В. Оценка эффективности комплексных биологических препаратов Gripp-Heel, Engystol, и Euphorbium compositum S в профилактике и лечении гриппа и острых респираторных вирусных инфекций у детей. Биологическая Терапия. 2003;(2):38-41.
3. Herzberger G, Weiser M. Homeopathic treatment of infections of various origins: a prospective study. Biomed Ther. 1997;15(4):123-127.
4. Torbicka E, Brzozowska-Binda A, Wilczynski J, Uzerowicz A. RSV infections in infants: therapy with a homeopathic preparation. Biomed Ther. 1998;16(4):256-260.
5. Heilmann A. A combination injection preparation as a prophylactic for flu and common colds. Biol Ther. 1994;12(4):249-253.
6. Gottwald R, Weiser M. Homeopathic therapy of pediatric upper respiratory infections [in German]. Ärzte Naturheilverf. 2000;41(6):348-353.
7. Rabe A. Symptomatic treatment of acute upper respiratory infections: a comparison of homeopathic and conventional therapies. Allgemeinarzt. 2003;25(20):1522-1523.

Энгистол®

Таблетки для рассасывания

Применять внутрь по 1 таблетке
3 раза в день, рассасывать
под языком за полчаса до еды
или спустя 1 час после приема
пищи на протяжении 2-3 недель

При обострениях принимают
по 1 таблетке каждые 15 минут
на протяжении не более двух часов

При необходимости
курс лечения можно повторить



8. Крамарев С.А., Палатная С.А., Головач Е.В., Чемеркина Н.В. Применение антигомотоксических препаратов в лечении острых респираторных вирусных инфекций у детей. Биологическая Терапия. 2005(1):19-22.
9. Weiser M, Gottwald R. Treatment of influenza and flu-like infections with a homeopathic medication [in German]. NaturaMed. 2000;15(1):15-18.
10. Weiser M, Gegenheimer L. Homeopathic treatment of upper respiratory diseases [in Spanish]. Med Biol (Spain). 2000;13(4):100-103.
11. Бурмак Ю. Г., Черепахина Л. П., Чернова О. В. Эффективность антигомотоксического препарата Бронхалис-пята в комплексной терапии детей, страдающих острым бронхитом. Биол Тер. 2006(3):39-40.
12. Glatthaar-Saalmüller B. Forschende Komplementärmedizin und Klass Naturheilkd. 2001
13. Müller-Krampe B, Gottwald R, Weiser M. Symptomatic Treatment of Acute Feverish Infections with a Modern Homeopathic Medication. International Journal for Biomedical Research and Therapy 2002;31(2):79-85.

45

Алгоритмы терапии в педиатрии

ОРИ. Симптоматическое лечение

Эуфорбиум композитум® Назентропфен С

Назальный спрей

Детям с 6 до 12 лет, а также лицам старше 12 лет и взрослым - впрыскивать по 1-2 дозы в каждую ноздрю 3-5 раз в день

Детям от 4 до 6 лет осторожно впрыскивать по 1 дозе 3-4 раза в день



Боль в горле



Ангин-Хель СД

Таблетки для рассасывания

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день за 30 мин до еды или спустя 1 час после приема пищи.
Таблетку следует держать во рту до полного рассасывания

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые полчаса или час (но не более 12 таблеток в день)

Длительность применения препарата, в зависимости от выраженной симптомов заболевания, составляет от 7-10 дней до 3-4 недель

Возможно проведение повторного курса лечения

www.heel-russia.ru

Повышение температуры тела, потливость или сухость кожных покровов, слабость, ломота в теле, беспокойство

Вибуркол®

Суппозитории ректальные

Применять Ректально

При острых респираторных вирусных инфекциях и болезненных симптомах прорезывания молочных зубов детям до 6-ти месяцев по 1 суппозиторию 2 раза в сутки; детям от 6 месяцев при температуре тела выше 37,5 °C по 1 суппозиторию 4 раза в сутки; при температуре тела выше 38 °C по 1 суппозиторию до 6 раз в сутки.

При нормализации температуры тела по 1 суппозиторию 1-2 раза в сутки еще 3-4 дня



Кашель



Бронхалис-Хель

Таблетки для рассасывания

При затяжном и хроническом течении

Принимать внутрь по 1 таблетке 3 раза в день, рассасывать под языком за полчаса до еды или спустя 1 час после приема пищи

При обострениях принимают по 1 таблетке каждые 15 минут на протяжении не более двух часов

Курс лечения составляет 2-3 недели и может быть повторен при необходимости

ИЛИ

Тартефедрель Н

Капли для приема внутрь

В комплексной терапии спастического варианта кашля

Применять внутрь по 10 капель (растворенных в 100 мл воды) 3 раза в день за 30 минут до еды или через 1 час после еды

При острых симптомах в начале лечения принимать через каждые 15 минут по 10 капель в течение 2-х часов на протяжении 2-4 недель

